

## ЗАКЛУЧОК

Оваа студија покажува дека примарната хирургија може ефектно да се справи со повеќето карциноми на очните капаци и периорбиталната кожа без обзир на големината на дефектите и локализацијата на туморот. Повеќето од хируршките техники овде опишани се релативно едноставни

процедури во еден акт, кои можат да се извршат во локална анестезија како дневни случаи, правејќи ја хирургијата иницијален третман на избор кај овие тумори.

Нашите анализи потврдуваат дека ексцизијата и супсеквентната окулопластична реконструкција е ефективен метод во третманот на карциномите на очните капаци и периорбиталната кожа.

## REFERENCES/ЛИТЕРАТУРА

- [1] Mustarde JC. Repair and reconstruction in the orbital region, Edinburgh: Churchill Livingstone 1980.
- [2] Mustarde JC. Major reconstruction of the eyelids: functional and aesthetic considerations. Clin Plast Surg 1981; 8:227.
- [3] Mehta HK. A new method of full-thickness skin graft fixation. B J Ophthalmol 1979; 63: 125-8.
- [4] Bostwick J III, Vasconez LO, Jurkiewicz MJ. Basal cell carcinoma of the medial canthal 4. Whiting M.H. Surgical treatment of rodent ulcer near the eye. Transactions of the Ophthalmological Societies of the United Kingdom 1951; 71:3-16.
- [5] Collin JRO. Eyelid reconstruction and tumour management. In: Manuel of sistematic eyelid surgery. 2<sup>nd</sup> ed. London: Churchill Livingstone, 1989:93.
- [6] Reifler DM, Hornblass A. Squamous cell carcinoma of the eyelid. Surv Ophthalmol 1986;6:349-65.
- [7] Harrington JN: Reconstruction of the medial canthus by spontaneous granulation (Laissez-Faire): a review, Ann Ophthalmol 1982; 14:956.
- [8] Hawes MJ. Free autogenous grafts in eyelid tarsoconjunctival reconstruction. Ophthalmic Surg 1987;18:37-41.
- [9] Hornblass A. Oculoplastic, orbital, and Reconstructive Surgery. Vol 1. Baltimore: Williams & Wilkins 1988; 34-9, 556-72.
- [10] Leone CR and Van Gemert JV. Lower eyelid reconstruction with upper eyelid transpositional grafts. Ophthalmic Surg 1980; 11:315.
- [11] McCord CD and Wesley R. Reconstruction of the upper eyelid and medial canthus. In McCord CD, editor: Oculoplastic Surgery, New York, 1982.
- [12] McGregor IA: Eyelid reconstruction following subtotal resection of upper or lower lid, Br J Plast Surg 1973;26:346.
- [13] Patrinely JR, Marines HM, Anderson RL. Skin flaps in periorbital reconstruction. Surv Ophthalmol 1987;31:249-61.
- [14] Putterman AM: Reconstruction of the eyelids following resection for carcinoma. Clin Plast Surg 1985; 12:393.