



МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
MACEDONIAN MEDICAL ASSOCIATION
ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА /
СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ASSOCIATION OF GP / FM DOCTORS OF REPUBLIC OF MACEDONIA



III КОНГРЕС НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА / СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО МЕГУНАРОДНО УЧЕСТВО
III CONGRESS OF GP / FM DOCTORS OF REPUBLIC OF MACEDONIA
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

ЗБОРНИК НА АПСТРАКТИ BOOK OF ABSTRACTS



Охрид, 26–29 Април 2012 година

Ohrid, April 26–29, 2012

Македонски медицински преглед
Списание на Македонското лекарско друштво
Год: 66 (supl. 84), стр. 1 – 232, 2012

СТАТИСТИЧКИ ПРИКАЗ НА ХОСПИТАЛИЗИРАНИ БОЛНИ ОД МАЛИГНА НЕОПЛАЗМА НА ЖЕЛУДНИК СПОРЕД МКБ 10 РЕВИЗИЈА (C16.0 – C16.9) ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН (2006 – 2010)



Малинска П., Пејчиновски Г., Брчина И., Пејчиновска Р.

Центар за јавно здравје Скопје, ГОБ „8 септември”, Скопје, Р. Македонија

Цел: Статистички приказ на пациенти лекувани во болниците во Скопје со малигна неоплазма на желудник.

Материјал и метод: Индивидуални извештаи за стационарно лекувано лице (Обр. бр. 3-21-61A) со клиничка дијагноза (C16.0 – C16.9) според МКБ 10 Ревизија.

Статистички метод на работа: Обработка на дата бази на 2.741 Индивидуални извештаи од 2006 до 2010 година.

Резултати и дискусија: Во анализираниот период во болниците во Скопје од вкупно лекуваните пациенти со клиничка дијагноза неоплазми C00-D48, биле 4,8%, додека дијагнозите со шифрите C00-C97 биле застапени со 3,6%. Нивното просечното траење на лекување изнесувало 23,15 дена.

Морбидитетот од неоплазмите C00-D48 на 1.000 жители во Скопје е највисок во општините Центар, Кисела Вода и Карпош.

Од вкупниот број на лекувани болни во истражуваниот период 0,6% отпаѓаат на карциномот на желудник.

Во однос на половата структура кај пациентите со дијагноза карцином на желудник 65,0% се мажи и 35,0% жени. Најчесто застапена возрасна структура е од 60 до 69 години со 32,6%. Возраста на пациентите од 30 до 39 години во 2010 година е 5 пати повеќе застапена во однос на 2006, додека возраста од 20 до 29 години е 2 пати повеќе застапена. Во истражувањето просечното траење на лекување кај пациенти со карцином на желудник изнесува 19,5 дена.

Заклучоци: Во 2010 година бројот на пациенти со клиничка дијагноза: малигнот на желудник е за 27,6% зголемен во однос на 2006 година.

Во однос на локализациите според МКБ 10 Ревизија со највисок процент се пациенти со карцином на кардијален отвор, кардио-езофагиален спој, препилорус, препилоричен канал и мала кривина на желудникот.

Просечно траење на лекување кај пациенти со карцином на желудник во 2010 година е намалено за 1 ден во однос на 2007 и за 3 дена во однос на 2009.

Клучни зборови: малигни неоплазми, желудник, хоспитализирани болни