



20th КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКОТО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
во соработка со
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ "СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ

онлајн



75
ГОДИНИ
YEARS
1945 - 2020

20th CONGRESS OF THE MACEDONIAN MEDICAL ASSOCIATION
In collaboration with
MEDICAL FACULTY, UNIVERSITY "SS. CYRIL AND METHODIUS" - SKOPJE

online

10th - 20th November, 2020
Republic of North Macedonia

онлајн

online



ЗБОРНИК НА АПСТРАКТИ ABSTRACT BOOK

www.cong2020.mld.mk

МАКЕДОНСКИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД - СПИСАНИЕ НА МАКЕДОНСКОТО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО ГОД 74(SUPL,108), 2020
MACEDONIAN MEDICAL REVIEW - JOURNAL OF MACEDONIAN MEDICAL ASSOCIATION YEAR:74(SUPL,108), 2020

ISBN-978-9989-37-041-0



UDK:61+061.231=866=20
CODEN:MK MPA 3
ISSN0025-1097

Session code: 03D

Постер презентација / Poster Presentation

Хистопатолошки промени на ендометриумот кај пациентки со абнормално крварење од утерус и ризик фактори за појава

Ана Коцевска¹, Кристина Скепаровска¹

¹ Специјална болница за гинекологија и акушерство "Мајка Тереза" Чаир – Скопје

Клучни зборови: абнормално крварење, утерус, фракционирана експлоративна киретажа

Вовед: Абнормалните крварења од утерус се комплексен гинеколошки проблем, особено во перименопаузалниот и постменопаузалниот период кај жената. Етиологијата може да биде органска (ендометријален полип, хиперплазија, миом, атрофија на ендометриум, карцином) или неорганска (дисфункционално крварење од утерус)

Цели: Да се направи анализа на хистопатолошките наоди на примероците од фракционирана експлоративна киретажа кај пациентки со абнормално крварење од утерус и да се истражат одредени ризик фактори за нивна појава.

Материјал и методи: Се работи за проспективна студија врз вкупно 70 испитанички кај кои имало потреба да се направи фракционирана експлоративна киретажа заради абнормално крварење од утерус. Испитаничките се поделени во две групи: 38 во постменопаузална возраст и 32 во пременопаузална возраст. Податоците се собираа преку интервју и анализа на наодите од хистопатолошките анализи на примероците добиени со фракционирана експлоративна киретажа. Студијата е изведена во Специјалната болница за гинекологија и акушерство "Мајка Тереза" – Чаир.

Резултати: Средна возраст на испитаничките во постменопаузалната група е 57 години, а во пременопаузалната група 43 години. Средна вредност за BMI (Body mass index) во постменопаузалната група е 33, а во пременопаузалната група е 25. Најзастапени патолошка промена на ендометриумот во двете групи е Polypus endometrii (кај 39,5% од постменопаузалните и 46,9% од пременопаузалните испитанички. Кај 4 испитанички (5,7% од вкупниот број), дијагностициран е Adenocarcinoma endometrii. Кај 65,8% од постменопаузалните испитанички, утврдено е присуство на хипертензија. Истата е детектирана кај 34,4% од испитаничките во пременопауза. Кај 7,9% од постменопаузалните испитанички, утврдено е присуство на дијабет. Истиот е детектиран кај 12,5% од испитаничките во пременопауза. Кај 10,5% од постменопаузалните испитанички, утврдено е дека примале хормонална терапија во текот на животот, а 6,2% од испитаничките во пременопауза примале хормонална терапија.

Заклучок: Да се потенцира важноста на дијагностичката фракционирана експлоративна киретажа, со цел брза и навремена дијагностика на премалигни и малигни промени на женскиот генитален тракт. Особено значење се придава на постменопаузалната возраст кога не смее да се појавува никакво крварење и кога се почести органските причини.