



МАКЕДОНСКИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД  
СПИСАНИЕ НА МАКЕДОНСКОТО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО



**КОНГРЕС НА РЕСПИРАТОРНА  
МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
Здружение на пулмолози на Република Македонија

**CONGRESS OF RESPIRATORY  
MEDICINE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA**  
Society of Pulmonologists of the Republic of Macedonia

# ЗБОРНИК НА АПСТРАКТИ ABSTRACT BOOK



ISSN 0025-1097



9 770025 109002

**6-9** ОКТОМВРИ **2016** Хотел „Изгрев“ - Струга  
OCTOBER Hotel "Izgreva" - Struga



## 37. ПОВТОРНИ ПРИЕМИ И ПРЕЖИВУВАЊЕ КАЈ ПАЦИЕНТИ ПО ТРЕТМАН СО НИВ ПОРАДИ АКУТНА ЕГЗАЦЕРБАЦИЈА НА ХОББ

Пејковска С., Каева Б., Брешковска Г., Гошева З., Арсовски З., Арбутина С., Јанева Е., Зејнел С, Ангеловска И., Дебрешлиоска А.  
ЈЗУ У Клиника за пулмологија и алергологија, Скопје, Македонија

**Вовед:** Неинвазивна вентилација (НИВ) претставува ефикасен режим за третман кај пациенти со акутна егзацербација на ХОББ (АЕХОББ) од среден и тежок степен.

**Цел:** Проценка на преживувањето и ратата на повторни приеми во тек на 6 месеци по третман со НИВ поради АЕХОББ.

**Пациенти и методи:** Проспективно се анализирани 34 пациенти хоспитализирани на Клиниката за пулмологија поради АЕХОББ во период од 09/2013 до 12/2015, успешно третирани со НИВ и пуштени на домашно лекување.

**Резултати:** М/Ж: 23/11, средна возраст 64г.(+/-10.2), 31 пациент бил на домашна оксигенотерапија, 32/34 биле сегашни (n=19) или бивши пушачи (n=13). Кај тројца пациенти статусот на преживување беше непознат. 5/31 (16%) починале во тек на 6 месеци по АЕХОББ. Ратата на повторни приеми во тек на 6 месеци по првата егзацербација беше 45%, додека 32% од нив беа хоспитализирани повеќе од еднаш.

**Заклучок:** Потребни се понатамошни истражувања со цел оптимализација на третманот кај пациентите со ХОББ, редукација на хоспитализациите и подобрување на квалитетот на живот.