

# О ТРАНСФОРМАЦИЈИ ЈЕДНЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ

од  
ДРАГОСЛАВА С. МИТРИНОВИЋА

## I.

1. Предмет овог рада је диференцијална једначина првог реда

$$(1) \quad \left( \frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2 \right)^p \left( \frac{dy}{dx} + b_1 y + b_2 \right)^q = f(x),$$

где су  $p$  и  $q$  цели бројеви који испуњавају ове услове:

$$(2) \quad pq \neq 0, \quad p + q \neq 0.$$

Коефицијенти  $a_1, a_2, b_1, b_2$  су ма какве функције променљиве  $x$  уз ограничење

$$(3) \quad a_1 \neq b_1.$$

Претпоставимо још

$$(4) \quad f(x) \neq 0.$$

Ако нису испуњени услови (3) и (4), диференцијална једначина (1) се може свести на линеарну диференцијалну једначину.

Исти је случај, ако је

$$p + q = 0.$$

Ако је

$$p = 0 \quad \text{или} \quad q = 0,$$

једначина (1) се такође своди на линеарну једначину.

У случају када је истовремено

$$p = 0, \quad q = 0,$$

једначина (1) престаје да буде диференцијална једначина.

2. Ако је

$$p = kq, \quad (k = \text{цео број}),$$

једначина (1) може да се упрости кореновањем, пре него што се приступи трансформацији једначине (1) која се има у виду у овој расправи.

Нека су:

1°  $m_1$  и  $m_2$  цели бројеви, позитивни или негативни;

2°  $n_1$  и  $n_2$  цели позитивни бројеви.

У таквом се случају проучавање диференцијалне једначине

$$(5) \quad \left( \frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2 \right)^{\frac{m_1}{n_1}} \left( \frac{dy}{dx} + b_1 y + b_2 \right)^{\frac{m_2}{n_2}} = f(x)$$

може свести на проучавање једначине облика (1).

Заиста, ако се изрази који се налазе на левој и десној страни једначине (5) степенују са  $n_1 n_2$ , долази се до једначине облика (1).

## II.

3. Пођимо од диференцијалне једначине (1) и ставимо у њој

$$(6) \quad \frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2 = \lambda^q,$$

где је

$$\lambda = \lambda(x), \quad \lambda \neq 0.$$

Диференцијална једначина (1) тада постаје

$$\lambda^{pq} \left( \frac{dy}{dx} + b_1 y + b_2 \right)^q = f(x),$$

тј.

$$(7) \quad \lambda^p \left( \frac{dy}{dx} + b_1 y + b_2 \right) = c(x),$$

где је функција  $c(x)$  дефинисана помоћу релације

$$(8) \quad [c(x)]^q = f(x).$$

Посматрајмо сад једначине (6) и (7), тј. систем

$$\frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2 = \lambda^q,$$

$$\frac{dy}{dx} + b_1 y + b_2 = \frac{c}{\lambda^p}.$$

Решењем овог система линеарних једначина по  $\frac{dy}{dx}$  и  $y$ , добија се:

$$(9) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{b_1}{b_1 - a_1} \lambda^q - \frac{a_1 c}{b_1 - a_1} \frac{1}{\lambda^p} + \frac{a_1 b_2 - a_2 b_1}{b_1 - a_1},$$

$$(10) \quad y = -\frac{1}{b_1 - a_1} \lambda^q + \frac{c}{b_1 - a_1} \frac{1}{\lambda^p} + \frac{a_2 - b_2}{b_1 - a_1}.$$

Из последње две релације може се извести закључак:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( -\frac{1}{b_1 - a_1} \lambda^q + \frac{c}{b_1 - a_1} \frac{1}{\lambda^p} + \frac{a_2 - b_2}{b_1 - a_1} \right) \\ = \frac{b_1}{b_1 - a_1} \lambda^q - \frac{a_1 c}{b_1 - a_1} \frac{1}{\lambda^p} + \frac{a_1 b_2 - a_2 b_1}{b_1 - a_1}. \end{aligned}$$

Ако се у последњој релацији изврше назначене операције и потребна сређивања, долази се до алгебарске диференцијалне једначине облика

$$(11) \quad \frac{d\lambda}{dx} = \frac{\alpha_0 \lambda^{p+q+1} + \alpha_1 \lambda^{p+1} + \alpha_2 \lambda}{\beta_0 \lambda^{p+q} + \beta_1}.$$

Коефицијенти

$$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \beta_0, \beta_1$$

јесу функције променљиве  $x$ . Они су дефинисани изразима:

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= -\left(\frac{1}{b_1 - a_1}\right)' - \frac{b_1}{b_1 - a_1}, \\ \alpha_1 &= \left(\frac{a_2 - b_2}{b_1 - a_1}\right)' - \frac{a_1 b_2 - a_2 b_1}{b_1 - a_1}, \\ (12) \quad \alpha_2 &= \left(\frac{c}{b_1 - a_1}\right)' + \frac{a_1 c}{b_1 - a_1}, \\ \beta_0 &= \frac{q}{b_1 - a_1}, \\ \beta_1 &= \frac{cp}{b_1 - a_1}. \end{aligned}$$

Ознака

$$(\varphi)',$$

где је  $\varphi = \varphi(x)$ , има значење:

$$(\varphi)' = \frac{d\varphi}{dx}.$$

Диференцијална једначина (11) спада у тип једначина

$$(13) \quad \frac{d\lambda}{dx} = \frac{A_0\lambda^m + A_1\lambda^{m-1} + A_2\lambda^{m-2} + \dots + A_{m-1}\lambda + A_m}{B_0\lambda^n + B_1\lambda^{n-1} + B_2\lambda^{n-2} + \dots + B_{n-1}\lambda + B_n},$$

где је:

$$A_k = A_k(x), \quad (k = 0, 1, 2, \dots, m),$$

$$B_i = B_i(x), \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n);$$

и где су  $m$  и  $n$  цели позитивни бројеви.

Једначина (13) је Appell-ова диференцијална једначина.<sup>1</sup>

4. Диференцијална једначина (1) је *првог* реда, а степена:

$$1^0 \quad p + q, \quad \text{ако је } p > 0, \quad q > 0;$$

$$2^0 \quad |p| + |q|, \quad \text{ако је } p < 0, \quad q < 0;$$

$$3^0 \quad \max(|p|, q), \quad \text{ако је } p < 0, \quad q > 0;$$

$$4^0 \quad \max(p, |q|), \quad \text{ако је } p > 0, \quad q < 0.$$

Тако, на пример, једначина

$$\left(\frac{dy}{dx} + a_1y + a_2\right)^{-3} \left(\frac{dy}{dx} + b_1y + b_2\right)^{-2} = f(x)$$

јесте степена

$$|p| + |q| = 3 + 2 = 5.$$

Једначина

$$\left(\frac{dy}{dx} + a_1y + a_2\right)^{-3} \left(\frac{dy}{dx} + b_1y + b_2\right)^2 = f(x)$$

есте степена

$$\max(|p|, q) = \max(3, 2) = 3.$$

Укратко речено, степен једначине (1) је:

$$(14) \quad 1^0 \quad h = |p| + |q|,$$

ако  $p$  и  $q$  имају исте знаке;

<sup>1</sup> О проблему интеграције Appell-ове једначине видети:

<sup>1</sup> P. Appell, *Sur les invariants de quelques équations différentielles (Journal de Mathématiques pures et appliquées, quatrième série, t. 5, 1889, p. 361—423);*

<sup>2</sup> Д. Митриновић, *Прилог интеграћењу извесне класе алгебарских диференцијалних једначина I реда (Глас Српске академије наука, књ. 165, 1935, стр. 165—170);*

<sup>3</sup> H. Lemke *Ueber eine Klasse von Differentialgleichungen erster Ordnung (Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 180, 1939, S. 141—188).*

$$(15) \quad 2^0 \quad h = \max(|p|, |q|),$$

ако  $p$  и  $q$  имају различите знаке.

*Диференцијална једначина (11) је алгебарска диференцијална једначина првог реда и првог степена.*

Облик (11) је нарочито подесан ако је:

$$(16) \quad p + q > 0, \quad p + 1 \geq 0.$$

Тако, на пример, када је

$$p = -1, \quad q = 2,$$

једначина (11) добија облик

$$(17) \quad \frac{d\lambda}{dx} = \frac{\alpha_0 \lambda^2 + \alpha_2 \lambda + \alpha_1}{\beta_0 \lambda + \beta_1},$$

а то је Аbel-ова диференцијална једначина.<sup>1</sup>

У случају када је

$$p = 2, \quad q = -1,$$

диференцијална једначина (11) постаје<sup>2</sup>

$$\frac{d\lambda}{dx} = \frac{\alpha_1 \lambda^3 + \alpha_0 \lambda^2 + \alpha_2 \lambda}{\beta_0 \lambda + \beta_1}.$$

Ако нису испуњени услови (16), тада разломку

$$(18) \quad \frac{\alpha_0 \lambda^{p+q+1} + \alpha_1 \lambda^{p+1} + \alpha_2 \lambda}{\beta_0 \lambda^{p+q} + \beta_1}$$

треба дати такав облик, да и бројитељ и именитељ тога разломка буде један полином (цела рационална функција) по  $\lambda$ .

Тако, на пример, ако су:

$$p < 0, \quad q < 0,$$

диференцијалној једначини (11) треба дати овај облик

$$\frac{d\lambda}{dx} = \frac{\alpha_2 \lambda^{-p-q+1} + \alpha_1 \lambda^{-q+1} + \alpha_0 \lambda}{\beta_1 \lambda^{-p-q} + \beta_0}.$$

У случају ако је

$$p + 1 < 0, \quad q \geq 1,$$

<sup>1</sup> *Oeuvres complètes de Niels Henrik Abel, nouvelle édition, publiée par L. Sylow et S. Lie, t. II, 1881, p. 26—35.*

<sup>2</sup> О интеграцији ове једначине видети:

E. Haentzschel, *Ueber die Form des Integrals der Differentialgleichung*  $\frac{dy}{dx} = \frac{p_0 + p_1 y + p_2 y^2 + p_3 y^3}{q_0 + q_1 y}$  (*Journal für die reine und angewandte Mathematik*, Bd. 112, 1893, S. 148—155).

једначини (11) треба дати нов облик:

$$\frac{d\lambda}{dx} = \frac{\alpha_0 \lambda^q + \alpha_2 \lambda^{-p} + \alpha_1}{\beta_0 \lambda^{q-1} + \beta_1 \lambda^{-p-1}};$$

тада је степен полинома

$$\alpha_0 \lambda^q + \alpha_2 \lambda^{-p} + \alpha_1$$

једнак

$$\max(q, -p);$$

степен полинома

$$\beta_0 \lambda^{q-1} + \beta_1 \lambda^{-p-1}$$

јесте

$$\max(q-1, -p-1).$$

Тако, на пример, једначини (1), за случај када је:

$$p = -2, \quad q = 3$$

одговара једначина (11) облика

$$\frac{d\lambda}{dx} = \frac{\alpha_0 \lambda^3 + \alpha_2 \lambda^2 + \alpha_1}{\beta_0 \lambda^2 + \beta_1 \lambda}.$$

И у осталим случајевима лако је подесити да  $\frac{d\lambda}{dx}$ , тј. израз (18), буде једнак количнику два полинома по  $\lambda$ .

Диференцијалну једначину (11) зваћемо *резолвентом* једначине (1).

5. Према изложеном може се формулисати овај:

**Став.** *Ако се на непознатој функцији у изврши рационална трансформација*

$$y = -\frac{1}{b_1 - a_1} \lambda^q + \frac{c}{b_1 - a_1} \frac{1}{\lambda^p} + \frac{a_2 - b_2}{b_1 - a_1},$$

алгебарска диференцијална једначина првог реда

$$\left(\frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2\right)^p \left(\frac{dy}{dx} + b_1 y + b_2\right)^q = f(x),$$

чији је степењен

$$h = |p| + |q|, \quad \text{ако је } pq > 0;$$

$$h = \max(|p|, |q|), \quad \text{ако је } pq < 0,$$

своди се на алгебарску диференцијалну једначину првог реда и првог степена

$$\frac{d\lambda}{dx} = \frac{\alpha_0 \lambda^{p+q+1} + \alpha_1 \lambda^{p+1} + \alpha_2 \lambda}{\beta_0 \lambda^{p+q} + \beta_1},$$

где су  $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \beta_0, \beta_1$  функције од  $x$ , дефинисане формулама (12).

Укратко речено, алгебарска диференцијална једначина првог реда (1), чији је степен  $h \geq 2$  има за резолвенту алгебарску диференцијалну једначину првог реда и *првог степена*.

### III.

6. Поставимо сада обрнути проблем који се састоји у овоме:

Даша је резолвента (11); одредиши одговарајућу диференцијалну једначину (1), тј. коефицијенте

$$a_1, b_1, a_2, b_2, c$$

изразити као функцију коефицијената

$$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \beta_0, \beta_1.$$

Да бисмо решили овај проблем, пођимо од резолvente (11), написане у облику

$$(19) \quad \frac{d\lambda}{dx} = \frac{A_0 \lambda^{p+q+1} + A_1 \lambda^{p+1} + A_2 \lambda}{B \lambda^{p+q} + 1},$$

где је:

$$(20) \quad \begin{aligned} A_0 &= \frac{\alpha_0}{\beta_1}, \\ A_1 &= \frac{\alpha_1}{\beta_1}, \\ A_2 &= \frac{\alpha_2}{\beta_1}, \\ B &= \frac{\beta_0}{\beta_1}. \end{aligned}$$

Дељење са  $\beta_1$  овде је било допуштено, јер је

$$\beta_1 = \frac{cp}{b_1 - a_1},$$

а према претпоставци, напред уведеној,

$$c \neq 0, \quad p \neq 0, \quad a_1 \neq b_1.$$

Систем једначина (20), према формулама (12), постаје:

$$(21) \quad \frac{b_1 - a_1}{cp} \left[ - \left( \frac{1}{b_1 - a_1} \right)' - \frac{b_1}{b_1 - a_1} \right] = A_0,$$

$$(22) \quad \frac{b_1 - a_1}{cp} \left[ \left( \frac{a_2 - b_2}{b_1 - a_1} \right)' - \frac{a_1 b_2 - a_2 b_1}{b_1 - a_1} \right] = A_1,$$

$$(23) \quad \frac{b_1 - a_1}{cp} \left[ \left( \frac{c}{b_1 - a_1} \right)' + \frac{a_1 c}{b_1 - a_1} \right] = A_2,$$

$$(24) \quad \frac{q}{cp} = B.$$

Из једначине (24) непосредно излази

$$(25) \quad c = \frac{q}{Bp},$$

ако се претпостави да је

$$B(x) \neq 0.$$

Када се у једначини (21) изврши назначено диференцирање, добија се

$$(26) \quad \frac{(b_1 - a_1)'}{b_1 - a_1} \cdot \frac{1}{cp} - \frac{b_1}{cp} = A_0.$$

Релација (23), када се у њој изврше једноставне трансформације, добија облик

$$(27) \quad -\frac{(b_1 - a_1)'}{b_1 - a_1} \cdot \frac{1}{cp} + \frac{c'}{c^2 p} + \frac{a_1}{cp} = \frac{A_2}{c}.$$

Комбиновањем једначина (26) и (27) долази се до нове једначине

$$\frac{c'}{c^2 p} - \frac{b_1 - a_1}{cp} = A_0 + \frac{A_2}{c},$$

одакле следује

$$(28) \quad b_1 - a_1 = \frac{c'}{c} - A_0 cp - A_2 p.$$

Коефицијент  $c$  је одређен формулом (25) у функцији датих вредности  $p$ ,  $q$ ,  $B$ , па је и разлика

$$b_1 - a_1,$$

као што следује из формуле (28), такође дефинисана као функција вредности које су, према задатом проблему, познате.

Ради краткоће у писању уведемо ознаку

$$(29) \quad \tau = b_1 - a_1 = \frac{c'}{c} - A_0 cp - A_2 p,$$

тј., према (25),



$$(30) \quad \tau = -\frac{B'}{B} - q \frac{A_0}{B} - A_2 p$$

и претпоставимо да је

$$\tau \neq 0.$$

Из једначине (26), водећи рачуна о формулама (25) и (30), излази:

$$(31) \quad b_1 = \frac{\tau'}{\tau} - q \frac{A_0}{B}.$$

Из једначине (27), када се узму у обзир формуле (25) и (30), следује:

$$(32) \quad a_1 = A_2 p + \frac{\tau'}{\tau} + \frac{B'}{B}.$$

До сада смо изразили  $c(x)$ ,  $a_1(x)$ ,  $b_1(x)$  у функцији коефицијената  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $B$ . Остаје још да нађемо  $a_2(x)$  и  $b_2(x)$  у функцији наведених коефицијената.

Коефицијенти  $a_2$  и  $b_2$  појављују се само у једначини (22), која се може трансформисати на облик

$$(a_2 - b_2)' - \frac{(b_1 - a_1)'}{b_1 - a_1} (a_2 - b_2) - (a_1 b_2 - a_2 b_1) = A_1 c p.$$

Последња једначина, с обзиром на формуле (25) и (30), постаје

$$(33) \quad \frac{da_2}{dx} - \left( \frac{\tau'}{\tau} - b_1 \right) a_2 - \left( b_2' - \frac{\tau'}{\tau} b_2 + a_1 b_2 + q \frac{A_1}{B} \right) = 0.$$

За одређивање коефицијената  $a_2$  и  $b_2$  имамо само једну једначину, тј. (33). Према томе, један од тих коефицијената, на пример  $b_2$ , може бити произвољна функција од  $x$ , док ће други коефицијент, тј.  $a_2$ , бити дефинисан линеарном диференцијалном једначином првог реда

$$(34) \quad \frac{da_2}{dx} = \varphi_1(x) a_2 + \varphi_2(x),$$

где је, према (33),

$$\varphi_1(x) = \frac{\tau'}{\tau} - b_1,$$

$$\varphi_2(x) = b_2' - \frac{\tau'}{\tau} b_2 + a_1 b_2 + q \frac{A_1}{B}.$$

Последње две формуле, према (31) и (32), постају

$$\varphi_1(x) = q \frac{A_0}{B},$$

$$\varphi_2(x) = b_2' + \frac{B'}{B} b_2 + p A_2 b_2 + q \frac{A_1}{B}.$$

7. Нека је сад резолвента диференцијалне једначине (1) дата у облику

$$(35) \quad \frac{d\lambda}{dx} = \frac{A_0 \lambda^m + A_1 \lambda^n + A_2 \lambda}{B \lambda^{m-1} + 1},$$

где су  $m$  и  $n$  цели бројеви, позитивни или негативни.

Ако се упореде једначине (19) и (35), добија се

$$p = n - 1,$$

$$q = m - n.$$

Претпоставићемо да  $n \neq 1$ . Ако је  $n = 1$ , имамо  $p = 0$ , тј. случај који смо напред искључили из наших посматрања.

Исто тако, претпоставићемо да је  $m \neq n$ . Ако је  $m = n$ , то значи да је  $q = 0$ , што смо такође искључили из наших посматрања.

Најзад, претпоставићемо да је  $m \neq 1$ , јер релација  $m = 1$  повлачи за собом

$$p + q = 0$$

што је у противности са напред уведеном претпоставком (видети § 1).

8. Према резултатима добијеним у §§ 6 и 7 може се формулисати овај:

**Став.** За сваку диференцијалну једначину (35), у којој су унапред даће вредности

$$m, n, A_0(x), A_1(x), A_2(x), B(x)$$

$$(m \neq 1, n \neq 1, m \neq n, B \neq 0)$$

може се формираши одговарајућа једначина (1), у којој су

$$p, q, a_1(x), b_1(x), c(x)$$

дефинисани помоћу формула:

$$p = n - 1,$$

$$q = m - n,$$

$$a_1 = (n-1)A_2 + \frac{\tau'}{\tau} + \frac{B'}{B},$$

$$b_1 = \frac{\tau'}{\tau} - (m-n) \frac{A_0}{B},$$

$$c = \frac{m-n}{n-1} \cdot \frac{1}{B};$$

коэффицијент  $a_2(x)$  је решење линеарне једначине

$$\frac{da_2}{dx} = (m-n) \frac{A_0}{B} a_2 + b_2' + \frac{B'}{B} b_2 + (n-1) A_2 b_2 + (m-n) \frac{A_1}{B},$$

где је  $b_2(x)$  произвољна функција променљиве  $(x)$ .

Функција<sup>1</sup>  $\tau(x) \neq 0$  дефинисана је изразом

$$\tau(x) = -\frac{B'}{B} - (m-n) \frac{A_0}{B} - (n-1) A_2.$$

9. Према последњем ставу, једној унапред датој диференцијалној једначини облика (35) одговара једна класа једначина облика (1) са једном произвољном функцијом ( $a_2$  или  $b_2$ ). Резолвента се, стога, може сматрати као један редуковани облик једначине (1).

Диференцијалне једначине облика (35) биле су предмет истраживања са разних гледишта. Два става, изведена у овој расправи, који дају кореспонденцију између једначина (1) и (35) и обрнуто, могу бити узети као полазна тачка за истраживања како квантитативне тако и квалитативне природе. Тако, на пример, може се непосредно формулисати овај:

**Став.** Сваки случај интегралитетна једне диференцијалне једначине облика (35) даје једну класу интегралних диференцијалних једначина облика (1), где фигурише једна произвољна функција

10. Ваља приметити да је G. Halphen<sup>2</sup>, полазећи са геометриског гледишта, указао на могућност редукције извесних диференцијалних једначина првог реда на облик у коме ће линеарно фигурирати извод непознате функције.

Посматрана једначина (1) у овој расправи припада класи Halphen-ових једначина.

<sup>1</sup> Ову нову претпоставку:  $\tau(x) \neq 0$  треба додати већ уведеним претпоставкама за коэффицијенте  $m, n, B$ .

<sup>2</sup> G. Halphen, *Sur la réduction de certaines équations différentielles du premier ordre à la forme linéaire, par rapport à la dérivée de la fonction inconnue* [Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, t. 87, 1878 (II), p. 741].

## IV.

11. Важни су случајеви:

$$1^{\circ} \quad p = 1, \quad q = 1;$$

$$2^{\circ} \quad p = -1, \quad q = 2;$$

$$3^{\circ} \quad p = 2, \quad q = -1.$$

Тада једначина (1) има респективно ове облике:

$$(36) \quad \left( \frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2 \right) \left( \frac{dy}{dx} + b_1 y + b_2 \right) = f(x),$$

$$(37) \quad \left( \frac{dy}{dx} + b_1 y + b_2 \right)^2 = f(x) \left( \frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2 \right),$$

$$(38) \quad \left( \frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2 \right)^2 = f(x) \left( \frac{dy}{dx} + b_1 y + b_2 \right).$$

Ако се у овим једначинама изврше назначене операције, долази се до диференцијалне једначине првог реда, другог степена

$$(39) \quad A \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 + 2By \frac{dy}{dx} + Cy^2 + 2D \frac{dy}{dx} + 2Ey + F = 0,$$

где су коефицијенти  $A, B, C, D, E, F$  функције коефицијената  $a_1, a_2, b_1, b_2, f$ , тј. функције независно променљиве  $x$ .

У једном ранијем раду<sup>1</sup> смо показали: да се диференцијалне једначине (36), (37) и (38) могу редукovati на облик (39); и обрнуто да се са облика (39) може прећи на један од облика (36), (37), (38), према томе да ли је

$$\Delta = B^2 - AC \neq 0$$

или је  $\Delta = 0$ .

Исто тако, у истом раду показали смо да се са диференцијалних једначина облика

$$(40) \quad \frac{d\lambda}{dx} = \frac{\alpha_0(x)\lambda^3 + \alpha_1(x)\lambda^2 + \alpha_2(x)\lambda}{\beta_0(x)\lambda^2 + \beta_1(x)},$$

$$\frac{d\lambda}{dx} = \frac{\alpha_0(x)\lambda^2 + \alpha_1(x)\lambda + \alpha_2(x)}{\beta_0(x)\lambda + \beta_1(x)}$$

може прећи на једначину (39) и обрнуто.

<sup>1</sup> D. Mitrovitch, *Transformation et intégration d'une équation différentielle du premier ordre* (Publications mathématiques de l'Université de Belgrade, t. 5, 1936, p. 10—22).

Овај случај смо раније навели и на њему се овде нећемо даље задржавати.

Диференцијална једначина (39) игра важну улогу у разним проблемима<sup>1</sup> диференцијалне геометрије и стога горе наведени резултати имају извештан интерес.

Приметимо да је наш цитирани резултат о једначини (39) ушао у Камке-ово дело<sup>2</sup> о диференцијалним једначинама.

15 децембар 1947.

Математички институт

Државног универзитета у Скопју

---

<sup>1</sup> Видети, на пример,

<sup>10</sup> Д. Митриновић, *О једној класи диференцијалних једначина првога реда на које се налази у разним проблемима геометрије* (Глас Српске академије наука, књига 181, 1939, стр. 133—168). *Résumé en français dans le Bulletin de l'Académie serbe des sciences*, t. 6, 1939, p. 99—120);

<sup>20</sup> D. Mitrinovitch, *Sur l'équation différentielle des lignes asymptotiques* (Publications mathématiques de l'Université de Belgrade t. 3, 1934, p. 175—178);

<sup>30</sup> D. Mitrinovitch, *Sur les lignes de courbure des surfaces réglées à plan directeur* (Publications mathématiques de l'Université de Belgrade, t. 5, 1936, p. 100—102).

<sup>2</sup> E. Камке, *Differentialgleichungen. Lösungsmethoden und Lösungen*, Bd. I, 1942, S. 373.

## Резюме

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО  
УРАВНЕНИЯ

от

Д. С. Митриновича

1.— Предметом этой записки является алгебраическое дифференциальное уравнение первого порядка (1)<sup>1</sup>, где  $p$  и  $q$  обозначают два произвольных числа, под условием что бы было

$$pq \neq 0, \quad p+q \neq 0.$$

Коэффициенты  $a_1, a_2, b_1, b_2, f$  являются функциями от  $x$  и  $t$  такими что

$$a_1 \neq b_1 \quad f(t) \neq 0.$$

Степень уравнения (1) будет

$$h = |p| + |q|$$

если  $p$  и  $q$  одного знака;

$$h = \max(|p|, |q|)$$

если  $p$  и  $q$  противоположного знака.

2.— Если ставим

$$\frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2 = \lambda^q \quad (\lambda \neq 0),$$

уравнение (1) становится равносильным системе

$$\frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2 = \lambda^q,$$

$$\frac{dy}{dx} + b_1 y + b_2 = \frac{c}{\lambda^p},$$

в которой функция  $c(x)$  определяется отношением

$$c^q = f(x).$$

Последняя система приводит к уравнениям (9) и (10). Обозначая что (9) является производной выражении (10), получаем для  $\lambda$  дифференциальное уравнение (11), в котором коэффициенты  $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \beta_0, \beta_1$  (функции от  $x$ ) определены формулой (12)

Степень уравнения (11) равна единице, между тем как степень уравнения (1)  $h \geq 2$ .

3.— Из всего изложенного можем высказать следующее предложение:

Совершая на неизвестной функции  $y$  рациональное преобразование

$$y = -\frac{1}{b_1 - a_1} \lambda^q + \frac{c}{b_1 - a_1} \frac{1}{\lambda^p} + \frac{a_2 - b_2}{b_1 - a_1},$$

<sup>1</sup> См. сербский текст впереди.

дифференциальное уравнение (1) принимает вид

$$\frac{d\lambda}{dx} = \frac{\alpha_0 \lambda^{p+q+1} + \alpha_1 \lambda^{p+1} + \alpha_2 \lambda}{\beta_0 \lambda^{p+q} + \beta_1},$$

коэффициенты которого являются функциями от  $p, q, a_1, a_2, b_1, b_2, c$  (см. формулы 12).

4.— Каждое уравнение (1) коэффициенты которого подчиняются выше высказанным условиям, согласно изложенному поступку, приводится к форме (11).

Предложим теперь обратную задачу:

Если дано уравнение (резолвента)

$$(R) \quad \frac{d\lambda}{dx} = \frac{A_0(x)\lambda^m + A_1(x)\lambda^n + A_2(x)\lambda}{B(x)\lambda^{m-1} + 1}$$

( $m$  и  $n$  представляют два целых числа, таких что  $m \neq 1, n \neq 1, m \neq n; B \neq 0$ ), определить начальное уравнение, соответствующее уравнению (1).

Эта задача разрешается следующим предложением:

Каждому дифференциальному уравнению первого порядка и первой степени вида (R) соответствует одно уравнение первого порядка и степени  $h$  вида (1) в котором  $p, q, a_1, b_1, c$  определяются формулами<sup>1</sup>:

$$p = n - 1,$$

$$q = m - n,$$

$$a_1 = (n - 1) A_2 + (\log \tau)' + (\log B)',$$

$$b_1 = (\log \tau)' - (m - n) \frac{A_0}{B},$$

$$c = \frac{m - n}{n - 1} \frac{1}{B},$$

$$\tau = -(\log B)' - (m - n) \frac{A_0}{B} - (n - 1) A_2;$$

коэффициент  $a_2$  является решением линейного уравнения

$$\frac{da_2}{dx} - (m - n) \frac{A_0}{B} a_2 - \left[ b_2' + b_2 (\log B)' + (n - 1) A_2 b_2 + (m - n) \frac{A_1}{B} \right] = 0;$$

коэффициент  $b_2$  является произвольной функцией.

Предположим что  $\tau \neq 0$ .

Учитывая последнее предложение, получаем что одному уравнению вида (R) соответствует всегда одно уравнение вида (1), в котором появляется одна произвольная функция.

Воспользовавшись этим, можем, на пример высказать следующее предложение:

Каждое уравнение (R) которое возможно интегрировать, приводит к одному разряду интегрирующихся дифференциальных уравнений формы (1), с одной произвольной функцией.

<sup>1</sup>  $(\log \omega)' = \frac{1}{\omega} \frac{d\omega}{dx}, \omega = \omega(x).$

5.— Партикулярные случаи уравнения (1) для:

$$1^0 \quad p=1, \quad q=1;$$

$$2^0 \quad p=-1, \quad q=2;$$

$$3^0 \quad p=2, \quad q=-1$$

были уже исследованы нами<sup>1</sup> и вкратце изложены в новом сочинении<sup>2</sup> Камке-а, посвящённом дифференциальным уравнениям.

### Résumé

## TRANSFORMATION D'UNE ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

par

D. S. MITRINOVITCH

1. L'objet de cette Note est l'équation différentielle algébrique du premier ordre (1),\* où  $p$  et  $q$  désignent deux entiers quelconques sous la condition que

$$p \neq 0, \quad p+q \neq 0.$$

Les coefficients

$$a_1, a_2, b_1, b_2, f$$

de l'équation (1) sont des fonctions de  $x$ , telles que

$$a_1 \neq b_1, \quad f(x) \neq 0.$$

Le degré de l'équation (1) est:

$$1^0 \quad h = |p| + |q|,$$

si  $p$  et  $q$  ont les mêmes signes:

$$2^0 \quad h = \max(|p|, |q|)$$

si  $p$  et  $q$  ont des signes différents.

2. Si l'on pose

$$\frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2 = \lambda^q$$

avec

$$\lambda = \lambda(x), \quad \lambda \neq 0,$$

<sup>1</sup> D. Mitrinovich, *Transformation et intégration d'une équation différentielle du premier ordre* (Publications mathématiques de l'Université de Belgrade, t. 5, 1936, p. 10—22).

<sup>2</sup> E. Kamke, *Differentiagleichungen. Lösungsmethoden und Lösungen*, Bd. I, 1942, S. 373.

\* Voir le texte en langue serbe en ce qui concerne les formules numérotées en chiffres arabes.



l'équation (1) est équivalente au système

$$\frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2 = \lambda^q,$$

$$\frac{dy}{dx} + b_1 y + b_2 = \frac{c}{\lambda^q},$$

où la fonction  $c(x)$  est définie par la relation

$$c^q = f(x).$$

Le dernier système fournit les relations (9) et (10). En exprimant que (9) est la dérivée de (10), on trouve pour  $\lambda$  l'équation différentielle (11), dans laquelle les coefficients

$$\alpha_0(x), \alpha_1(x), \alpha_2(x), \beta_0(x), \beta_1(x)$$

sont définis au moyen des formules (12).

L'équation (11) rentre dans la classe d'équations (13) — type d'Appell.

Le degré de l'équation (11) est  $un$ , tandis que celui de l'équation (1) est  $h \geq 2$ .

3. D'après ce qui précède, on peut énoncer la

**Proposition.** *En effectuant sur la fonction inconnue  $y$  la transformation rationnelle*

$$y = -\frac{1}{b_1 - a_1} \lambda^q + \frac{c}{b_1 - a_1} \frac{1}{\lambda^p} + \frac{a_2 - b_2}{b_1 - a_1},$$

l'équation différentielle

$$\left( \frac{dy}{dx} + a_1 y + a_2 \right)^p \left( \frac{dy}{dx} + b_1 y + b_2 \right)^q = f(x)$$

prend la forme

$$\frac{d\lambda}{dx} = \frac{\alpha_0 \lambda^{p+q+1} + \alpha_1 \lambda^{p+1} + \alpha_2 \lambda}{\beta_0 \lambda^{p+q} + \beta_1},$$

où les coefficients sont des fonctions des

$$p, q, a_1, a_2, b_1, b_2, f$$

[voir les formules (12) dans le texte en langue serbe].

4. Chaque équation (1), dont les coefficients sont assujettis aux restrictions indiquées, en suivant le procédé qui vient d'être exposé, peut être réduite à la forme (11).

Proposons-nous maintenant le problème inverse consistant en ceci:

Étant donnée une équation (équation résolvante) de la forme

$$(R) \quad \frac{d\lambda}{dx} = \frac{A_0(x) \lambda^m + A_1(x) \lambda^n + A_2(x) \lambda}{B(x) \lambda^{m-1} + 1}$$

( $m$  et  $n$  = deux entiers positifs tels que  $m \neq 1, n \neq 1, m \neq n; B \neq 0$ ), déterminer l'équation initiale correspondante (1).

Ce problème se résout par la

**Proposition.** *A chaque équation différentielle du premier ordre et du premier degré de la forme (R), correspond une équation du premier ordre et du degré h de la forme (1), où*

$$p, q, a_1(x), b_1(x), c(x)$$

sont définis par les formules<sup>1</sup>

$$\begin{aligned} p &= n-1, \\ q &= m-n, \\ a_1 &= (n-1)A_2 + (\log \tau)' + (\log B)', \\ b_1 &= (\log \tau)' - (m-n)\frac{A_0}{B}, \\ c &= \frac{m-n}{n-1} \frac{1}{B}, \end{aligned}$$

avec<sup>2</sup>

$$\tau = -(\log B)' - (m-n)\frac{A_0}{B} - (n-1)A_2;$$

e coefficient  $a_2$  est la solution de l'équation linéaire

$$\frac{da_2}{dx} = (m-n)\frac{A_0}{B}a_2 + b_2' + b_2(\log B)' + (n-1)A_2b_2 + (m-n)\frac{A_1}{B},$$

où  $b_2$  est arbitraire.

5. D'après la dernière proposition, à une équation de la forme (R) correspond une équation de la forme (1), où intervient une fonction arbitraire.

Mettant à profit ce fait, on peut énoncer, par exemple,

**Proposition.** *Chaque cas d'intégrabilité de l'équation (R) conduit à une classe d'équations intégrables de la forme (1), avec une fonction arbitraire.*

6. Les cas de l'équation (1) pour:

$$\begin{aligned} 1^0 \quad & p = 1, \quad q = 1; \\ 2^0 \quad & p = -1, \quad q = 2; \\ 3^0 \quad & p = 2, \quad q = -1 \end{aligned}$$

ont déjà fait l'objet de nos recherches<sup>3</sup>, lesquelles sont résumées dans le nouveau *Traité* de Kamke<sup>4</sup>, consacré à des équations différentielles.

Le 15 décembre 1947.  
Institut de mathématiques de l'Université  
d'Etat à Skopje.

<sup>1</sup>)  $(\log \omega)'$  désigne

$$\frac{1}{\omega} \frac{d\omega}{dx}, \quad \omega = \omega(x)$$

<sup>2</sup>) On suppose que

$$\tau(x) \neq 0.$$

<sup>3</sup>) D. Mitrinovitch, *Transformation et intégration d'une équation différentielle du premier ordre* (Publications mathématiques de l'Université de Belgrade, t. 5, 1936, p. 10-22).

<sup>4</sup>) E. Kamke, *Differentialgleichungen. Lösungsmethoden und Lösungen*, Bd. I, 1942, S. 373.